

醫

學

綱

目

醫學綱目卷之十五

肝膽部

頭風痛

產頭痛

偏頭痛

雷頭痛

大頭痛

眉痛

頭重

頭風屑

頭痛多主於痰

**四**頭痛

多主於痰痛甚者火多有可吐者亦有可下者

火

**五**金匱真言論云東風生於春病在肝俞在頸項故春氣

東垣天法

老病在頭又諸陽會於頭面如足太陽膀胱之脈起於目

內眥上額交巔直入絡腦還出別下項病衝頭痛又足少

陽膽之脈起於目銳眥上抵頭角病則頭角額痛夫風從

上受之風寒傷上邪從外入客經絡令人振寒頭痛身重

惡寒治在風池風府調其陰陽不足則補有餘則瀉汗之

則愈此傷寒頭痛也

治法見傷寒條

頭痛耳鳴九竅不利者腸胃

之所生乃氣虛頭痛也

治法見氣虛條

如氣上不下頭痛巔疾者

下虛上實也過在足少陰巨陽甚則入腎寒濕頭痛也

治法

見寒有厥逆頭痛者所犯大寒內至骨髓髓以腦為主腦  
逆故令頭痛齒亦痛治見有心煩頭痛者病在膈中過在  
手巨陽少陰乃濕熱頭痛也治見

頭痛分三陰三陽見陰陽條

諸血虛頭痛當歸川芎主之 諸氣虛頭痛人參黃芪主

之主者主治也兼見何證以佐使藥治之此立方之大法

也 血氣俱虛頭痛者於調中益氣湯加川芎蔓荊子細

辛其効如神 諸濕厥頭痛清空膏主之即風濕熱頭痛也方見濕氣條

諸痰厥頭痛半夏白木天麻湯主之方見脾土條 諸厥逆

頭痛羌活附子湯主之方見寒條 如濕熱在頭者以苦吐之

不可執方而治方見實條

三陽散  
而寒之

三陽頭痛

羌活

防風

荊芥

升麻

葛根

白芷

柴胡

川芎

芍藥

細辛

蔥白

連翹分兩

陰證頭痛只用溫中藥如理中薑附之類也

**四**凡頭痛皆以風藥治之者總其大體而言之也高巔之

上惟風可到故味之薄者陰中之陽自地升天者也然亦

有三陰三陽之異太陽經頭痛惡風寒脈浮緊川芎獨

活之類為主少陽經頭痛脈弦細往來寒熱柴胡黃芩

主之陽明經頭痛自汗發熱不惡寒脈浮緩長實者升

麻葛根石膏白芷主之太陰經頭痛必有痰體重或腹

痛為痰癖脈沉緩者蒼朮半夏南星主之少陰經頭痛

三陰三陽經不流行而足寒氣逆為寒厥其脈沉細麻黃

附子細辛湯主之厥陰經頭疼項痛或吐痰沫冷厥其

脈浮緩吳茱萸湯主之方見傷寒

三陰燥而溫之

清空膏治偏正頭痛年深不愈者及療風濕熱頭痛上壅損目及腦痛年深不止

羌活

防風各一兩

柴胡七錢

川芎五錢

甘草

炙一兩半

黃連

炒一兩

黃芩

三兩一半酒製一半炒

右為細末每服二錢熱蓋內入茶少許湯調如膏抹在口內少用白湯送下臨臥如苦頭痛每服中加細辛二錢如太陰脈緩有痰名曰痰厥頭痛加羌活防風川芎甘草又加半夏一兩半如偏正頭痛服之不愈減羌活防風川芎一半加柴胡一倍如發熱惡熱而渴正陽明頭痛只與白虎湯加白芷

濕熱宜清之

東垣云諸濕熱頭痛清空膏主之丹溪云東垣清空膏諸般頭痛皆治惟血虛頭痛從魚尾相連痛者不治又云治少陽頭痛如痛在太陽厥陰者勿用蓋謂頭損痛也

**四** 小清空膏治諸般頭痛惟血虛頭痛不治用片苓細切酒拌勻晒乾為末茶清調下酒亦可

**五** 清上瀉火湯昔有人年少時氣弱於氣海三里節次約灸五七百壯至年老添熱厥頭痛雖冬天大寒猶喜風寒其頭痛便愈微來煖處或見烟火其痛復作五七年不愈皆灸之過也

羌活

錢三

防風

分七

升麻

分七

柴胡

分五

藜蘆

錢半

細辛

分少

川芎

分二

荆芥

分二

蒼朮

分三

蔓荊子

分二

黃芩

酒製  
錢半

黃連

酒製  
錢半

黃柏

酒製  
錢一

甘草

分五

知母

酒製  
錢半

當歸

分三

生地

錢半

黃芪

錢一

紅花

分少

右剉如麻荳大分作二服每服水二盞煎至一盞去渣稍熱服食遠

補氣湯服前藥之後服此藥

黃芪八分

甘草炙

歸身各二錢

柴胡

升麻各二分

細辛少許

麻黃炒

苦丁香各半錢

水煎服

安神散治頭旋眼黑頭痛

羌活一兩

防風二錢半

柴胡五錢

升麻五分

酒黃柏一兩

酒知母半錢

酒生地半兩

黃芪一兩

甘草炙三錢

生甘草三錢

右咬咀每服半兩水二大盞煎至一盞半加蔓荊子半

錢川芎三分再煎至一盞臨臥去查熱服

右東垣丹溪治虛熱頭痛大率皆以酒苓酒連酒柏加

風劑也

川芎散治頭風偏正頭痛昏眩

川芎

細辛

羌活

槐花

甘草

香附子

石膏

荊芥

薄荷

菊花

防風

茵陳

右為細末每服二錢食後茶清調下日三服

石膏散治頭疼不可忍

麻黃

去根

石膏

何首烏

葛根

右為細末每服三錢生薑三片水煎稍熱服

石膏散治頭疼

川芎

石膏

白芷

右各等分為細末每服四錢熱茶清調下

荊芥散治頭風

王太醫方

荊芥

石膏

右為細末每服二錢薑三片蔥白三寸和鬚使水一盞



煎至七分食後服

治丈夫婦人風虛頭疼氣虛頭疼婦人胎前產後傷風頭疼一切頭疼並皆治之

茵陳

揀淨

麻黃

石膏

煨存性各二兩

右為末每服一錢腦茶調下食後服服畢仰臥霎時

寒濕

玉真丸治腎氣不足氣逆上行頭疼不可忍謂之腎厥其脈舉之則弦按之則堅

硫黃

二兩

石膏

煨通赤研

半夏

湯洗

硝石

研各一兩

右為細末研勻生薑汁糊為丸如桐子大陰乾每服二十九薑湯或米飲下更灸關元百壯良方中黃丸子亦佳虛寒甚者去石膏用鍾乳粉一兩

腎虛則頭眩明帶

素問云頭疼巔疾下虛上實過在足少陰巨陽甚則入腎狗蒙招尤目眩耳聾下實上虛過在足少陽厥陰甚則入

肝下虛者腎虛也故腎虛則頭痛上虛者肝虛也故肝虛則頭暈狗蒙者如以物蒙其首招搖不定目眩耳聾皆暈之狀也故肝厥頭暈腎厥腹痛不同如此治肝厥釣藤散見厥門神妙丸治頭疼及腦風

食鹽

硫黃各等分

右爲末水調生麪爲丸如桐子大每服十五丸用薄荷茶食前下荊芥酒亦得

**丹**孫兆口訣治頭疼附子炮石膏煨等分爲末入腦麝少許酒茶下半錢妙

右硫附中加石膏之劑

治頭風如神附子一枚生去皮臍用葉豈一合同煮豈熟爲度去附子只喫豈立瘥每附子一枚可煮五次後末服之修真秘要

**本**治氣虛頭疼用大附子一枚剉去心入全蝎二箇在內取前附子末同鍾乳一分麪少許水和裹炮熟却研爲末以焦黃爲度蔥茶調下一錢或半錢

又方用大附子

一枚和皮  
臍生爲末

大川芎

一箇剉  
作四片

以水和附子末如麪劑裹川芎作四處如附子末少入少麪裹畢以針穿數孔子用真腦射薰其穴內覺附香再捻合穴子如未覺內有香卽再薰一炷細羅成灰用銚子內熱灰炮熟末之每服半錢蔥茶調下不拘時候

右酒醋湯湯去  
老二方神効

右附子純熱例

大寒犯  
腦頭痛  
齒亦痛

**帝**曰人有病頭痛數歲不已此安得之名爲何病岐伯曰當有所犯大寒內至骨髓髓以腦爲主腦逆故令頭痛齒亦痛病名曰厥逆

奇病  
逆論

羌活附子湯治冬月大寒犯腦令人腦痛齒亦痛名曰腦風出奇病論中

防風

分二

黃芪

錢一

麻黃

錢一

茯苓

錢半

升麻

分二

甘草

分二

黑附子

分一

羌活

錢半

白芷

白僵蚕

黃柏

各三分

右咬咀水煎去渣溫服食後若有寒嗽加佛耳草三分  
川芎神功散治風熱上攻偏正頭痛無問微甚久新並  
皆治之

川芎

兩一

甘草

錢二

川烏

生去皮臍

白芷

天南星

麻黃

去根各半兩

右爲末每服三錢水二盞生薑三片煎至七分投清酒  
半盞和查溫服密室避風如人行五七里再服汗出爲  
度其病立愈

救苦神白散治男子婦人偏正頭痛眉骨兩太陽穴痛及熱上攻頭目赤不已項筋拘急耳作蟬鳴

川芎

甘草炙各八錢

甘松去土

赤芍藥

白芷

兩頭尖

川烏頭去皮臍各六錢

右為細末每服二錢溫茶調下服藥後飲熟水半盞

**本**治一切頭疼黑龍丸

天南星

洗

川烏

各半斤黑豎并蒸三次

石膏

半兩

麻黃

薄荷

各四兩

葉本

白芷

各二兩

京墨

兩半

右為細末煉蜜杵丸彈子大每服一九薄荷茶湯調下

治傷寒頭疼太陽頭疼及一切頭疼

川烏

炮

草烏

各半兩

麻黃

川芎

防風

羌活

各一兩半

地龍

去土

全蝎

箇一

雄黃三錢

右為細末，每服半錢，食後茶清調下。

**國**麻黃吳茱萸湯治頭痛胸中痛食減少咽噎不利寒冷脈左寸弦急

麻黃半錢

吳茱萸二分

黃芩二分

川烏一分

羌活五分

細辛少許

蔓荊子一分

藜蘆本

柴胡

黃芪各二分

蒼朮錢一

黃連二分

半夏一分

黃柏

升麻各二分

紅花少許

當歸二分

虛

右咬咀作一服，水二大盞，煎至一盞，去渣，稍熱服，食後。

**東**陽陳允露筋骨體稍長，患體虛而勞，頭痛，甚至有訣別之言。予察其脈弦大而帶數，以人參為君，川芎陳皮為佐，至五六日未減，眾皆訝之，以藥之不對也。予曰：藥力有

次第更少俟一二宿當自安忽其季來問曰何不少加黃芪予不答又經一宿忽自言病頓愈予服之覺指下稍盛又半日病者言胃上滿不覺飢視其腹紋已隱矣予曰藥中莫加黃芪否曰然止與三貼遂連與二陳湯加厚朴枳殼黃連以瀉其衛三貼而安

血虛

血虛頭痛自魚尾上攻頭痛必用川芎當歸湯眉尖後近髮際口魚尾

大

一奇散治血虛頭痛神妙

即芎歸湯也

又方用川芎

半兩為末每服二錢臘茶調下甚効曾有產後頭痛者一

服即愈

外治頭痛欲裂當歸一兩酒一升煮取六合飲至醉効

氣虛

頭痛耳鳴九竅不利腸胃之所生也

通評虛實論云此氣虛頭痛

也用人參黃芪主之

氣虛頭痛治驗 參謀栢仲實年六十一歲二月間患

頭痛不可忍晝夜不得眠邀往視之其人云近在燕京患  
頭昏悶微痛醫作傷寒解之汗出後痛轉加後汗解病轉  
加而頭愈痛遂歸每召醫用藥雷同到今痛甚不得安臥  
惡風寒而不喜飲食診其脈弦細而微氣短而促懶言語  
內經曰春氣者病在頭今年高氣弱清氣不能上升頭面  
故昏悶此病本無表邪因發汗數四清陽之氣愈虧損不  
能上榮亦不能外固所以頭苦痛而惡風寒不喜飲食氣  
短弱宜升陽補氣頭痛自愈名之曰順氣和中湯

黃芪

半錢

人參

錢一

白朮

分五

陳皮

分三

當歸

分五

芍藥

分五

甘草

分二

升麻

分三

蔓荊子

分二

柴胡

分三

川芎

分二

細辛

分二

內經曰陽氣者衛外而為固也今年高氣弱又加發汗



衛外之氣愈損故黃芪甘溫補衛實表為君人參甘溫  
當歸辛溫補氣補血芍藥味酸收衛氣為臣白朮陳皮  
炙甘草苦甘溫養衛氣生發陽氣上實皮毛腠理為佐  
柴胡升麻苦辛引少陽陽明之氣上升通百脈灌漑周  
身者也川芎蔓荊子細辛辛溫體輕浮清利空竅為使  
右件咬咀作一服水二盞煎至一盞去渣溫服食後服  
之減半再服而愈

氣虛

**調中益氣湯**加川芎蔓荊子細辛治氣血俱虛頭暈方

治法

實

**千和**青黛散治頭風

猪牙皂角 玄胡索 青黛

右為細末水調並許鼻內灌之其涎自出先仰臥灌鼻  
俟喉中酸味即起身涎出口咬銅錢一文任流下

**丹**頭痛指鼻取涎

蕪撥

川芎

薄荷

白芷

細辛各等分

為末入猪膽內與汁拌勻陰乾再為末用無根水為丸如菉荳大青黛為衣每一丸茶清化灌鼻中口噙銅錢三文其涎來如泉一方有玄胡索葉本青黛無薄荷細辛

**本**治偏正頭風夾腦風并一切頭風不問年深日近尅日取効名透頂散

細辛

表白者三莖

瓜蒂七箇

丁香

三粒

糯米

七粒

腦子

麝香

各一黑豆大

右將腦麝乳鉢內研極細却將前四味研勻另自治為末然後入乳鉢內盪起腦麝令勻用瓦甌子盛之謹閉

觀口患人隨左右搖之一大荳許良久出涎一升許則安

濕熱在頭必吐之

東垣云濕熱在頭而頭痛者必以苦吐之若用上項搐鼻藥而涎少者必兼下項吐法治之

**聖**治痰厥頭痛以烏梅十箇取肉鹽二錢酒半盞合水煎至七分去渣非時溫服吐即住

**四**頭痛難忍支風痰所致梔子末蜜和濃塗舌上吐即止

女部集

頭痛非冷非風此膈有痰也濃煎茶啜一二升探吐之吐

而又吐候苦汁出乃止不損人待渴自止妙

外臺

**子**和茶調散瓜蒂好茶二味等分爲末每服二錢薑汁調下空心用之丹霞僊病頭痛常居暗室不敢見明其頭熱痛以布圍其顙上置冰於其中日易數次熱不能已諸

邪在胃  
必下之

醫莫識其證求見戴人戴人曰此三陽蓄熱故也乃置炭火於煖室中出汗涌吐三法併行七日方愈常仲明之子自四歲得風痰疾至十五歲轉甚每月發一二次發必頭痛痛則擊數百拳出黃綠涎一二盞方愈此年發益頻目見黑花昏不知人三四日方省諸醫皆用南星半夏化痰之藥終無一效戴人以雙解散發汗以苦劑吐痰病去八九續以分劑平調自春至秋如此數次方獲全瘥

邪在胃而頭痛者必下之其證必兼隔痞或動作則痛甚或右手脈滑盛者是也治法並見脾胃條

東風生於春病在頭俞在頸項全文五臟春氣者病在頭惡風為胃

頭面多  
汗為首  
風

**四**新沐中風為首風頭面多汗惡風當先風一日則病甚至其風日則少愈大川芎丸主之治見諸風條

大川芎九治首風旋暈弦急外合陽氣風寒相搏胃膈痰飲偏正頭疼身體拘攣

川芎

一斤 天麻 四兩 用

右為末煉蜜九每兩作十九每服一九細嚼茶酒下食後服

腦戶極  
今為腦  
風

風氣循風府而上則為腦風項背怯寒腦戶極冷神聖散主之

神聖散治腦風邪氣留飲不散項背怯寒頭痛不可忍

麻黃

去節

細辛

去苗

乾葛

生一炒一半

藿香葉

各等分

右為末每服二錢茶酒調下茶亦得并治血

風證

又方治腦風邪氣留飲頭疼不可忍用遠志末不以多少於鼻中搐於痛處揉之相兼前藥可用也

眼痛目  
淚為風  
痰

**丹**頭疼連眼痛此風痰上攻須用白芷開之

兩前茶 川芎 白芷 防風

台烏 細辛 當歸 為末湯調服

**世**偏正頭風川芎細辛防風白芷烏頭尖全蝎稍南星薑  
製麝香少許為末每一字溫酒調服

**丹**頭風方

羌活錢二 細辛錢一 川芎錢二 乾葛錢二

甘草半錢 防風錢二 半夏錢一

右除川芎細辛二味外研為末用酒和炒晒乾入川細  
二味末和勻每服一錢茶清調下

又方

荊芥 草烏尖片七 防風 甘草

台芎 蔓荊子 桔梗 麻黃

右為末茶調服

治頭疼面赤煩悶咽乾上膈風痰頭目暈昏百節疼痛

背項拘急苦辛丸

川芎

防風

僵蚕

獨活

各一兩

桔梗

麻黃

細辛

白附子

羌活

甘草

各四兩

薄荷

荊芥

各一兩

風虛則  
壅塞而  
痛宜辛  
散之

右為細末煉蜜丸如彈子大每服一粒茶酒吞下食後

微清膏

川芎

蔓荊子

錢一

細辛

分一

紫木

錢一

薄荷

生甘草

錢半

炙甘草

稍半錢

右為細末食後茶清調下一錢或半錢

治頭目風荊芥穗細辛川芎等分為末飯後湯點二錢

凡治頭痛皆用等芷羌防辛等溫氣藥升散者由風木

風盛則  
發後而  
病宜散  
收之

虛不能升散而土寡于畏得以壅塞而痛故用此助肝  
木散其壅塞也若風盛踈散太過而痛服辛散藥反甚  
者則宜用酸澁收而降之乃愈後乳香蘆落散是也

**乳香蘆落散**治男子婦人偏正頭疼不可忍大有神効

御米殼

去蒂陳皮

甘草

炙 桔梗

柴胡

去苗各一兩

右為細末每服二錢水一鍾入燈心十莖長四指同煎  
七分去查食後溫服

風濕痰

**頭**半夏白朮天麻湯治大陰痰厥頭痛眼黑頭旋惡心煩

亂眩門

東垣先生壯歲病頭痛每發時兩頰青黃眩運目不欲開  
懶於言語身沉體重兀兀欲吐數日方過潔古老人曰此  
厥陰太陰合而為病名曰風痰宜以局方王壺九治之少



風濕藥二味可加雄黃白朮以治風濕更有水煮金花丸更灸俠溪二穴各二七壯不旬日愈是知方者體也法者用也徒知體而不知用者弊體用不失可謂上工信矣哉

金花丸方見咳喘

**丹**徐舍人因作勞頭與目眶痛足冷身熱脈大而不甚數作勞瘵治之

半夏二錢

川芎

黃芩

白朮

陳皮一錢半

木通一錢

甘草少許

分二貼煎薑一片下保和丸三十丸

**羅**茯苓半夏湯治風熱痰逆嘔吐或眩運頭痛

半夏

三箇稍大者製

赤茯苓一錢

陳皮一錢湯洗

黃芩一分

甘草一錢

右用水二鍾生薑三片煎一盞分三服作一日溫服無

時

**丹**又治濕痰頭痛、

黃芩

酒炒三錢

蒼朮

酒炒一兩

川芎

細辛

各二錢

甘草

一錢

為末、搗生薑一片、和勻、茶清調服、

賈孺人脈沉有痰頭痛、

川芎

一錢

澤瀉

一錢酒炒

白朮

一錢半酒

煎下茯苓丸三十粒、

扶苓丸方見痰飲門

**聖**治偏正頭疼、併夾腦風、連兩太陽頭痛、以白僵蚕細研

為末、用蔥茶調服方寸七、

右濕痰頭痛用半夏南星及酒朮酒芩燥其痰也風痰

頭痛用風藥餘者並見風頭痛條

**素**陽明所謂客孫脈則頭痛鼻鼾腹腫者陽明并於上上

鼻鼾腹腫邪在

者則其孫絡太陰也故頭痛鼻鼽腹腫也脈解篇

**張**館職學士張居易嗜酒散誕不為名利拘束忽發熱頭  
疼俾翰林醫官治之十日愈甚諸學士共議召孫孫至脈  
之曰餘人皆曰傷寒故作此疾也張學士好酒多痰食所  
傷也今疾非傷寒而右手脈其數左手脈平和此必傷酒  
食而作頭痛宜喫食藥五七丸俟之半日進退決矣孫遂  
用食藥經食久膈漸寬頭痛遂減再進利膈藥遂獲安大  
凡陽邪頭疼經十日豈得不變發熱而狂亂故知非傷寒  
乃食病之過也

**胡**孺人因喫冷粉與肉頭痛自汗膈痞小便赤

白朮二錢半 陳皮一錢半 木通 川芎

黃芩各半錢

薑水煎熟吞下草薹薏九阿魏丸保和丸各五十粒

脈動作頭重痛熱氣潮者屬胃謂胃有酒食及痰痰之類也

**田**頭痛如破酒炒大黃半兩茶煎服

右以酒炒大黃下頭痛蓋病在胃而頭痛者必下之方愈也如孫兆以利膈藥下張學士傷食頭痛詳見本條郭茂恂以黑龍丹下其嫂金華君產後汚血頭痛詳見產後頭痛皆下咽即安是也

心火

心煩頭痛病在膈中過在手巨陽少陰東垣清空膏之類治之全文見治虛實後法

腎水

頭痛顛病下虛上實過在足少陰巨陽甚則入腎頭痛全文見治虛實法

運氣

許學士謂之腎厥頭疼也用玉真丸治之東垣云此寒濕頭痛氣上而不下也玉真丸方見寒熱條

運氣頭痛有四

一曰火鬱於上而痛經云少陽司天之政初之氣風勝乃搖候乃大濕其病氣怫於上頭痛二之氣火反鬱白埃四起其病熱鬱於上頭痛又云少陽司天火淫所勝民病頭痛發熱惡寒而瘡治以寒劑爲君也

二曰寒氣逐熱氣上行而痛經云歲金不及炎火乃行復則陰厥且格陽反上行頭腦戶痛延及腦頂發熱又云太陽之勝熱反上行頭項頂顛腦戶中痛目如脫又云太陽之復心痛痞滿頭痛治以熱劑爲君也

三曰濕邪傷腎膀胱而痛經云太陰司天濕淫所勝腰脊頭項痛時眩又云太陰在泉濕淫所勝病衝頭痛目似脫項似拔又云太陰之復頭項痛重而掉聽尤甚亦治以熱劑爲君也

四曰陽明復氣兼非位之心病而痛經曰陽明之復欬噦

雜方

煩心病在膈中頭痛治以溫劑也

**固**白芷散治風頭痛搗鼻

石膏二錢

薄荷錢三

芒硝二錢

鬱金

右細末口噙水搗鼻若症在太陽加羌活二錢防風一錢紅芷二粒為末搗之

川芎散搗鼻

青黛二錢半

蔓荊子

川芎各一錢二分

鬱金

芒硝各一錢

石膏一錢二分

細辛根一錢

薄荷葉二錢

紅芷一粒

右為末搗鼻

**四**瘦人搗鼻藥

軟石膏

朴硝半錢

腦子

檀香皮

荊芥

薄荷葉各一錢

白芷

細辛各三錢

羅如聖散治眼目偏痛頭風

麻黃燒灰半兩 盆硝二錢半

麝香

腦子各少許

右件為細末搗之神效

又方

楊梅青

硝石

伏龍肝等分

右為末搗鼻立效

河瓜蒂神妙散治偏正頭目昏眩及偏正頭痛

煇硝

雄黃

川芎

薄荷葉

道人頭即蒼耳子 藜蘆各一分

天竺黃一錢半

右為細末含水鼻中搗一字神驗

右六方搗鼻治頭痛屬熱者也

本治八般頭風

草烏尖

細辛等分

黃丹少許

右爲細末葦管搐入鼻中立効

**丹**

治卒頭上痛皂莢末吹鼻嚏則止

斗門方

**世**

火筒散治頭風應驗方

蚯蚓糞

錢四

乳香

錢二

麝香

計少

右爲末用紙筒自下燒上吸烟搐鼻內神効

**仲**

頭風摩散方

大附子

一枚

食鹽

分

右二味爲末以方寸七摩疹上令藥力行

**聖**

治風頭痛每天欲陰風雨先發者用桂心一兩爲末以

酒調如膏用傳頂上并額角

治頭風餅子

五倍子

全蝎

土狗

七箇

右爲末醋糊作如錢大餅子發時再用醋潤透貼太陽



穴上灸熱貼之驗甚仍用帕子縛之吸濃茶睡覺即愈

**聖**治時氣頭痛不止用朴硝二兩為末生油調塗於頂上

**經**患頭風山荳根搗末油調塗之

**食**治熱風頭痛燒杏仁令烟盡去皮尖以亂髮裹之咬於

所患處齒下其痛便止

**世**偏正頭痛風醉頭風以草麻子九粒先用米調成膏塗

茶碗底却用火燒草麻仁烟出以茶碗覆薰烟上候烟盡

用少湯衝開服之覺額上痒是効

**丹**頭內如虫蛀響名天白蟻用茶子細末吹鼻中周氏

**藥**厥頭痛面若腫起而煩心取之足陽明太陰厥病篇

厥頭痛頭脈痛心悲善泣視頭動脈反盛者刺盡去血後

調足厥陰頭痛項脾盛者厥頭痛貞貞都耕頭重而痛

滿頭上五行行五先取手少陰後取足少陰厥陰頭痛

意善忘按之不得取頭面左右動脈後取足太陰厥頭

痛項先痛腰脊為應先取天柱後取足太陽經云頭日苦

兩筋間蓋風府穴也又云足太陽脈是動則衝頭痛目如

脫項似按所生病者頭顙項痛故應頭痛取足太陽也

厥頭痛頭痛甚耳前後脈湧有熱瀉出其血後取足少

陽經云足少陽脈從耳後入耳中出走耳前所生真頭

痛頭痛甚腦盡痛手足寒至節死不治頭痛不可取于

脰者有所擊墮惡血在于內若肉傷痛未已可側刺不可

遠取也頭痛不可刺者大痺為惡日作者可令少愈不

可已陽迎頭痛腦滿不得息取之人迎陽迎即陽逆也又云肝氣逆則

頭痛耳聾頰腫取血者是瘀血腫滿處取之也

摘偏正頭風絲竹空沿皮向外透率谷風池橫針入寸半透風府合

谷半寸已上穴解溪三里中腕中腕一穴灸五十壯

集正頭風百會一分灸七壯上星二分灸七壯合谷

不愈 神庭灸七 太陽在兩額角眉後紫脈

醉頭風 內攢竹一 印堂五分灸 攢竹一分沿皮 三

里 寬中灸 風門沿皮向

摘頭風面腫項強不得回顧 天牖五分留七呼不宜補

血腫應合 意謔六分留三呼瀉五吸後取天

頭風 後谿 京骨

右手足太陽

王頭痛嘔吐 神庭一分 印堂在兩眉中沿皮透左攢竹

皮透右攢竹補三吸

摘風痰頭痛 豐隆五分灸 腎厥頭痛 湧泉三分彈

嘗治一老婦人頭痛久歲不已因視其手足有血絡皆

紫黑遂用三稜針盡刺出其血如墨汁者數盞後視其

受病之經灸刺之而得全愈即經所謂大痺為惡及頭

痛久痺不去身視其血絡盡出其血是也

**甲**腦風頭痛惡見風寒嘔衄鼻塞喘息不通承靈主之

頭痛身熱引兩頤急一作痛腦空主之 頭痛日愈天衝風

池主之已上諸穴在頤部第三行也善噦頭痛身熱頤厭主之 熱

病頭痛引目外眥而急煩滿汗不出引頤齒面赤皮疼懸

釐主之 熱病偏頭痛引目外眥懸釐主之 醉酒風熱

發兩角眩一作目痛不能飲食煩滿嘔吐率谷主之此條在

風 頸額播滿引牙齒口噤不開急痛不能言曲鬢主之

已上諸穴皆在耳前也頭痛引頸寢陰主之 頭風耳後痛煩心

及足不收失履口喎僻頸項搖戇牙車急完骨主之已上

皆在耳後也頭目腫子痛不可以視俠項強急不可以顧陽

白主之 頭痛目眩頸項強急胸脇相引不得傾側本神

主之已上諸穴皆在面部也頭痛振寒清淵主之 頭痛項背

急消瀼主之 頭風痛鼻衄眉頭痛善嚏目如欲脫汗  
出寒熱面赤頰中痛項強不可左右顧目系急惡癰潰竹  
主之 頭眩痛重目如脫項似拔狂見鬼目上反項直不  
可顧暴聾足不任身痛欲折天柱主之 風眩頭痛鼻不  
利時嚏涕自出風門主之 暴病頭痛身熱痛肌肉動  
耳聾惡風目眦爛赤項不可以顧脾經痛泄腸辟束骨主  
之 風眩頭痛少海主之 厥頭痛面浮腫煩心狂見鬼  
喜笑不休發於外有所大喜喉痺不能言豐隆主之 陽  
厥淒淒而寒少腹堅頭痛脛股腹痛消中小便不利善嘔  
三里主之 厥頭痛面腫起商丘主之 厥頭痛孔最主  
之 頭重頂痛目不明風到腦中寒重衣不熱汗出頭中  
惡風刺腦戶主之 頭重目瞑厥寒熱項強難以顧汗不  
出陶道主之 頭痛如破身熱如火汗不出癰瘕裏急腰

診

股相引痛命門主之

素寸口之脈中手短者曰頭痛平人氣象論

推而下之下而

不上頭項痛

脈診頭痛目痛久視無所見者死久視不見見諸脈病雜法下而不見見諸脈病雜

卒視上而不下者是病若頭痛目痛脈急短澀死未詳其義

產後頭痛

血虛

大一奇散治產後頭疼用當歸川芎為細末每服二錢水

一盞煎七分溫服

寒熱

產婦年三十餘身熱頭痛肚痛

陳皮

白朮

白芍各二錢

黃芩二錢半

川芎一錢

乾薑

牡丹皮

甘草各一錢半

荊芥半錢

分四貼煎服

**保**治產後頭痛血虛痰癖寒厥皆令頭痛加減四物湯

蒼朮

一兩六錢

羌活

川芎

防風

香附

炒

白芷

各一兩

石膏

二兩半

細辛

乙兩半

當歸

甘草

各五錢

右麤末每一兩水煎服無時如有汗者知氣弱頭痛也方中加芍藥三兩桂一兩半生薑煎如痰癖頭痛加半夏三兩茯苓一兩生薑煎如熱痰頭痛加白芷三兩石膏三兩知母一兩如寒厥頭痛加天麻三兩附子一兩半生薑三片煎服

敗血

**大**芩附散治產後敗血作梗頭痛諸藥不效

右大附子一枚醃醋一碗用火四畔灸透蘸醋令盡去皮臍加川芎一兩並為細末每服一錢茶清下

郭茂恂嫂金華君產七日不食始言頭痛頭痛已又心痛

作既而目睛痛如割如刺更作更止相去無瞬息間毋頭痛甚欲取大石壓良久漸定心痛作則以十指抓壁血流滿掌痛定目復痛又以兩手自剜取之如是十日不已衆醫無計進黑龍丹半粒疾少間中夜再服下瞑目寢如平常至平旦下一行約三升許如蝗蚩子三疾減半已刻又行如前則頻愈矣黑龍丹方見前後血不下餘

### 偏頭風

頭半邊痛者是也當與前頭痛相參用之

大法

**丹**偏頭風 有痰者多

左屬風 荆芥 薄荷 左屬血虛 川芎 當歸

右屬痰 蒼朮 半夏 右屬熱 黃芩

熱

**羅**川芎散治偏頭痛神効

甘菊 石膏 川芎 白僵蚕生各六錢



右爲極細末每服三錢茶清調下

**潔**治頭痛連睛痛

石膏

鼠粘子炒

右爲末茶清食前調下

**垣**細辛散治偏頭風

細辛二分

川芎七分

柴胡二錢

黃芩酒炒一錢

生黃芩五分

瓦粉二分

甘草炙一錢半

黃連酒炒七分

爲藥錢

右咬咀每服三錢水煎食後溫服之

寒濕

**經**治偏頭痛絕妙華揆爲末一兩於食前用清粥飲調半錢服

**本**治風寒客於頭中無時疼痛牽引兩目遂至失明宜白附散

白附子酒

麻黃節不去

川烏

南星各半兩

全蝎五

乾薑

硃砂

麝香

各一分

右為細末酒調一字服畧睡少時效一族人患頭痛不可忍一服瘳

治偏頭風

猪牙皂角

去皮筋

香白芷

白附子

各等分

右為末每服一錢臘茶調下右疼右邊臥左疼左邊臥皆疼仰臥食後服

**附** 偏頭風車撥猪膽搗鼻中

**治** 偏頭風用好蘿蔔自然汁一蛭殼許令患人仰臥左

疼注左右疼注右或兩邊皆疼皆注之雖十年患者亦効

王荆公患十二年用之立効後醫數人皆愈此禁中秘方

**雷** 頭半寒痛先取手少陽陽明後取足少陽陽明厥病篇

雷頭風

針灸

頭痛而起核塊者是也

**子和**凡雷頭懶于俗呼之謬名也可用茶調散吐之次用

神芩丸下之然後服烏荊丸及愈風餅子之類衰者可用

涼膈散消風散熱

實者下之

茶調散方見上下部解

大黃

黃芩各二兩

牽牛

滑石各四兩

右為細末滴水為丸如小豈大溫水下十五丸每服加

十丸以利為度日三服

表散

愈風餅子

川烏炮半兩

川芎

甘菊

白芷

防風

細辛

天麻

羌活

荊芥

薄荷

甘草炙已上各一兩

右為細末水浸蒸餅為劑捏作餅子每服三五餅細嚼

茶酒送下不計時候

涼膈散

方見前  
寒熱除

**張**夫治雷頭風者諸藥不効為與證不相對也蓋雷頭風者震卦主之震仰盂故予製藥內加荷葉者象震之形其色又青乃述類象形當煎局方中升麻湯主之升麻湯治頭面疙瘩增寒拘急發熱狀如傷寒

升麻

蒼朮

荷葉

右為細末每服五錢水一盞煎七分溫服食前後或燒全荷葉一箇研細調藥服之妙

針灸

**和**雷頭風者是頭上有赤腫結核或如酸棗狀可用排針出血則愈矣

**雷**雷頭風

上顙

百會

風池

大頭痛

上熱

頭痛如腫大如斗是也大率多是天行時疫病

**國**泰和年東垣以監納濟源稅時長夏多疫癘初覺憎寒體重次傳面目腫盛目不能開上喘咽喉不利舌乾口燥俗云大頭天行親戚不相訪問如染之多不救張縣丞亦得此證至五六日醫以承氣湯加藍根下之稍緩翌日其病如故下之又緩終莫能愈漸至危篤或曰李明之存心於醫可以請治遂命診視具說其由曰夫身半已上天之氣也身半已下地之氣也此雖邪熱客於心肺之間上攻頭而爲腫盛以承氣下之瀉胃中之實熱是誅罰無過殊不知適其病所爲故遂處方用黃連黃芩味苦寒瀉心肺間熱以爲君橘紅玄參苦寒生壯草甘寒瀉火補氣以爲臣連翹鼠粘子薄荷葉苦辛平板藍根味甘寒馬尾勃白僵蚕味苦平散腫消毒定喘以爲佐新升麻柴胡苦平行

少陽陽明二經不得伸，桔梗味辛溫，為舟楫，不令下行，共為細末，用湯調時服之，拌蜜為丸，噙化之，服盡良愈。因歎曰：往者不可追來者尤可及。凡他所有是病者，皆書方以貼之，全治甚眾。

普濟消毒飲子

黃芩

黃連

各半兩

人參

三錢

橘紅

玄參

甘草

生各二錢

連翹

鼠粘子

板藍根

馬尾勃

各一錢

白僵蚕

炒七分

升麻

七分

柴胡

桔梗

各二錢

右為細末，服如前法，或加防風、薄荷、川芎、當歸身、咬咀，如麻荳大，每服五錢，水煎，去渣，熱服之，食後，時時服之，如大便秘，加酒煨大黃一錢，或二錢，以利之，腫熱甚者，宜砭刺之。

海大頭病者雖在身半以上熱伏于經以感天地四時非節瘟疫之氣所着以成此疾至於潰烈膿出而又染他人所以謂之疫癘也大抵足陽明邪熱太其實資少陽相火爲之熾多在少陽或在陽明甚則逆傳視其腫勢在何部分隨其經而取之濕熱爲腫木盛爲痛此邪發於首多在兩耳前後所先見出者爲主爲根治之宜早藥不宜遲恐過其病所謂上熱未除中寒已作有傷人命矣此疾是自外而之內者是爲血病凡頭部分受邪見於無形之處至高之分當先緩而後急先緩者謂邪氣在上着無形之部分既着無形所傳無定若用重劑大瀉之則其邪不去反過其病矣雖用緩藥若又急服之或食前或頓服咸失緩體則藥不能除病矣當徐徐清無形之邪或藥性味形體擬象服餌皆須不離緩體及寒藥或酒炒浸之類皆是也

後急者謂前緩劑已經高分瀉邪氣入於中是到陰部未  
於有形質之所若不速去反損陰也此却爲客邪當急去  
之是治客以急也且治主當緩者謂陽邪在上陰邪在下  
各爲本家病也若急治之不惟不能解其紛而反致其亂  
矣此所以治主當緩也治客當急者謂陽分受陽邪陰分  
受陰邪主也陰分受陽邪陽分受陰邪客也凡所謂客者  
當急去之此治急以客也假令少陽陽明之爲病少陽  
者諸邪出於耳前後也陽明者首面大腫也先以黃芩黃  
連甘草通炒過劉煎少少不住服呷之或服畢再用大黃  
或酒浸或煨又以鼠粘子新瓦上炒香咬咀煎去渣內芒  
硝各等分亦細細呷之當食後用徐得微利及邪氣已只  
服前藥如不已再服後藥依前次第用之取大便利邪已  
卽止如陽明渴者加石膏少陽渴者加瓜蒌根湯陽明行



經加升麻葛根芍藥之類太陽行經加羌活防風荆芥之類選而加之並與上藥均合不可獨用散也

**黑**白散治大頭病如神

烏黑蛇酒浸 白花蛇去頭尾酒浸

雄黃二錢

大黃煨半兩

右為極細末每服一二錢白湯調無時

**疔**疫毒頭腫者耳枯湯加鼠粘子大黃芒硝

**丹**大頭天行病

羌活 酒淬 酒蒸大黃

厥 素巨陽之厥則腫首頭重全文

**山**大頭風用井底泥調大黃芒硝塗之此方若在表者忌之在裏者宜之

運氣大頭病皆屬火蓋經所謂上腫者即其屬也經云少

陽司天之政風熱參布大陰橫流寒乃時至民病上怫腫

風熱痰

色變又云少陰司天之收熱病生於上清病生於下民病  
噎乾腫上終之氣燥令行餘火內格腫於上咳喘其治方  
東垣普濟消毒飲子得之矣

眉痛

**四**眉痛屬風熱與痰作風痰治類頭風用白芷酒黃芩末

酒調下

又方

川烏

草烏二味為屑  
童便浸炒

細辛

羌活

黃芩

甘草各等分  
為佐

**垣**選奇湯眉骨痛不可忍

防風

羌活各三錢

酒黃芩

一錢冬不用如能  
食熱痛者加之

甘草

三錢夏生  
冬炙用

右咬咀每服三錢水煎稍熱服食後時時

針灸

保嬰

眉攢內痛

解溪

**取**

眉間痛

攢竹

濕出血沿皮透魚腹

頭維

一分沿皮斜向下透

**取**

眉棱骨痛

攢竹

合谷

神庭

頭重

濕氣

**取**

紅豆散治頭重如山此濕氣在頭也

麻黃根

沙半錢

苦丁香

紅荳

粒十

羌活

燒

連翹

各三錢

右五味為細末鼻內搐之

又方

羌活根

燒

連翹

各三錢

紅荳

半錢

右為末搐鼻

針灸

督脈之別名曰長強挾脊上項散頭上下當肩胛左右別走太陽虛則頭重高搖之挾脊之有過者取之所別也

全見針灸○長強穴在脊際即尾骨端也

撮頭重如石 印堂一分沿皮透橫竹先

頭風屑

老巢產

羅肝經風盛木自搖動尚書云滿招損老子云物壯則老故木凌脾土金來克之是子來為母復仇也使梳頭有屑皮見肺之證也謂肺主皮毛大便實滿青丸主之虛則消風散主之瀉青丸方見治虛實法

消風散治諸風上攻頭目昏痛項背拘急肢體煩痛肌肉蠕動目眩旋運耳簾蟬鳴眼澁好睡鼻塞多嚏皮膚頑麻燥痒癢疹又治婦人血風頭皮腫痒眉骨痠旋欲倒痰逆惡心

芩薈 羌活 人參 茯苓去皮

白僵蚕 藿香去土 荊芥 甘草炒

蟬殼去土各二兩 厚朴去皮製 陳皮去白各半兩 防風

雜方

右爲細末每服二錢茶清調下如久病偏頭風每日三服便覺輕減如脫着沐浴暴感風寒頭痛身重寒熱倦疼用荊芥茶清調下半盞不拘服之小兒虛風目溢昏倦及急慢驚風用乳香荊芥湯調下亦得

**丹**頭痺風屑發黃用酒炒大黃茶調服

**源**萬病紫死丸治頭多白屑每服三丸至五七丸薑湯下

方見積塊降

**本**治風屑極燥痒無時此乃氣虛風邪侵於皮表而生用藜蘆不拘多少爲末先洗頭須避風候未至十分乾時用末糝之須用入髮至皮方得緊縛之兩日夜次日即不燥痒如尚有些少可再用一次立効

禹錫按陳藏器云鹽麩子主頭風白屑効

俗名麩鹽挑其末結五倍子

**患**頭上白屑極多山荳根油浸塗以孩兒乳汁調塗効

木又方

白芷

零零香各等分

右為末如前法用之候三五日筴去傳三二次終始不生

多臥 不得臥

陰陽榮衛

黃帝曰病而不得眠者何氣使然岐伯曰衛氣不得入於陰常留於陽留於陽則陽氣滿陽氣滿則陽蹻盛不得入於陰則陰氣虛故目不瞑矣又曰病目不得視者何氣使然岐伯曰衛氣留於陰不得行於陽留於陰則陰氣盛陰氣盛則陰蹻滿不得入於陽則陽氣虛故目閉也大惑論足太陽有通項入于腦者正屬目本名曰眼系頭目苦痛取之在項中兩筋間入腦乃別陰蹻陽蹻陰陽相交陽入陰陰出陽交于目銳眥以蹻脈考之當作目內眥陽氣盛則瞋目陰

陰盛則瞑目

論

帝問曰夫邪氣之客入也或令人目

不瞑不臥出者何氣使然伯高曰衛氣者晝日行於陽夜

行於陰常從足少陰之分間行於五臟六腑今厥氣客於

五臟六腑則衛氣獨衛其外行於陽不得入於陰行於陽

則陽氣盛陽氣盛則陽蹇陷

陷常作滿

不得入於陰陰氣虛故

目不瞑黃帝曰治之奈何伯高曰補其不足瀉其有餘調

其虛實以通其道而去其邪飲以半夏湯一劑陰陽已通

其臥立至黃帝曰善此所謂決瀆壅塞經絡大通陰陽和

得者也愿聞其方伯高曰其湯方以流水千里以外者八

升揚之萬遍取其清五升煮之炊以葦薪火沸置秫米一

升治半夏五合徐炊令竭爲一升半去其渣飲汁一小杯

日三稍益以知爲度故其病新發者覆杯則臥汗出則已

矣久者三飲而已也

邪客篇○按本草秫米卽所謂糯米是也

黃帝曰人之

多臥者何氣使然岐伯曰此人腸胃大而皮膚濕則分肉不解其行遲夫衛氣者晝常行於陽夜行於陰故陽氣盡則寐陰氣盡則寤故腸胃大則衛氣行留久皮膚濕分肉不解則行遲留於陰也久其氣不清則目瞑故多臥矣其腸胃小皮膚滑以緩分肉解則衛氣之留於陽也久故少瞑焉黃帝曰其非常經也卒然多臥者何氣使然岐伯曰邪氣留於上焦上焦閉而不通已食若飲湯衛氣留久於陰而不行故卒然多臥焉

腸胃熱

**膽虛**不眠寒也酸枣仁炒竹葉湯調服聖惠方膽實多

睡熱也酸枣仁生用末茶薑汁調服濟衆方一法酸枣仁以生薑汁煮炙微焦搗羅爲末每服二錢水七分煮煎六分溫服無時

不得臥



虛勞

**仲** 虛勞虛煩不得眠酸棗湯主之

酸棗仁

仁二甘草一兩

知母

茯苓

芡實

各二兩一方加生薑二兩

右以水八升煮酸棗仁得六升內諸藥煮取三升分溫三服

**本** 治膽虛不得眠四肢無力驚甲丸

驚甲

酸棗仁

羌活

牛膝

黃芪

人參

五味子

各等分

右為細末煉蜜杵為丸如桐子大每服三四十九溫酒送下

**聖** 治骨蒸勞煩心不得眠用酸棗仁一兩水一大盞半研絞取汁下米二合煮粥候熟下地黃汁一合更煮過不計時服之

**素**帝曰人有臥而有所不安者何也岐伯曰藏有所傷及

精有所寄之則安故人不能懸其病也精有所寄之則安太素作精有所倚

則臥不安是也

**海**胡洽治振悸不得眠人參白朮茯苓甘草生薑酸棗仁

六物煮服

**肝虛****本**真珠母丸治肝經因虛內受風邪臥則寬散而不收狀

若驚悸

珠母三分研細用礬當歸

熟地各一兩半人參

酸棗仁 栝子仁 犀角 茯苓各一兩

沉香 龍齒各半錢

右為細末煉蜜為丸如桐子大辰砂為衣每服四五十

丸金銀薄苛湯下日午後臥服

獨活湯

獨活

羌活

人參

前胡

細辛

半夏

五味子

沙參

白茯苓

酸棗仁

甘草各一兩

右爲粗末每服四大錢水一盞半薑三片烏梅半箇同煎至七分去渣不拘時候

紹興癸丑予待次四明有董生者患神氣不寧每臥則鬼飛揚覺身在牀而神鬼離體驚悸多魘通夕無寐更醫不効予爲診視詢之曰醫作何病治董曰衆皆以爲心病予曰以脈言之肝經受邪非心病也肝氣因虛邪氣襲之肝藏魂者也遊魂爲變平人肝不受邪臥則魂歸於肝神靜而得寐今肝有邪魂不得歸是以臥則魂飛揚若離體也肝主怒故小怒則劇董欣然曰前此未之聞雖未服藥已覺沉痾去體矣願求治之予曰公且持此說與衆醫議所

治之方而徐質之閱旬日復至云醫徧議古今方無與病相對者故予處此二方以贈服一月而病悉除此方用真珠母為君龍齒佐之其珠母入肝經為第一龍齒與肝同類也龍齒虎睛今人例以為鎮心藥殊不知龍齒安魂虎睛定魄各言其類也蓋東方蒼龍木也屬肝而藏魂西方白虎金也屬肺而藏魄龍能變化故魂遊而不定虎能專靜故魄止而有守予謂治鬼不寧者宜以虎睛治魂飛揚者宜以龍齒萬物有成理而不失在夫人達之而已

肝虛則  
浮之水  
飲作

**頭**羌活勝濕湯加柴胡治臥而多驚邪在少陽厥陰也方見諸水病者故不得臥臥則驚驚則欬甚也全文見

內經半夏湯治不得臥乃去飲之劑也方見前

**無**溫膽湯治大病後虛煩不得眠兼治驚悸方見

肝虛則  
思之思

**丹**煩不得眠六乙散加牛黃服之即愈

元散

是處勝

診

子和一富家婦人傷思慮過甚二年不得寐無藥可療其夫求戴人治之戴人曰兩手脈俱緩此脾受邪也脾主思故也乃與其夫議以怒激之多取其財飲酒數日不處一法而去其婦大怒汗出是夜困眠如此者八九日不寢自是食進其脈得平此因膽虛不能制脾之思慮而不寐今怒之怒膽復制脾故得寐也

陽明者胃脈也胃者六腑之海其氣亦下行陽明逆不得從其道故不得臥也下經曰胃不和則臥不安此之謂也逆調

喘不得臥 以喘法治之

厥不得臥 以腳氣法求之

帝曰人之不能偃臥者何也岐伯曰肺者藏之蓋也肺氣盛則肺大肺大則不能偃臥

針灸  
膽寒不得臥 竅陰一分補之灸

得臥浮郅主之

多臥

濕熱

子和陳州長史一小兒病寐而不寤三日諸醫作睡驚治之或欲以艾火灸之或以大驚丸及水銀餅子治之其父曰此子平日無疾何驟有驚乎以子之病問戴人戴人診其兩手脈皆平和戴人曰若驚風之脈當洪大而強今則平和非驚風也戴人竊問其乳母爾三日前曾飲酒醉否遽然笑曰夫人以煮酒見餉酒味甚美三飲一罍而睡夫陳酒味甘而戀膈酒氣滿乳兒亦醉也乃剉甘草乾葛花縮砂仁貫衆煎汁啜之立醒

連氣

連氣多睡皆屬內熱經云陽明司天之政初之氣陰始凝氣始肅病中熱善眠是也

針灸怪穴困睡多 無名指第二節尖灸一壯屈手指取之

咽喉 喉痺 咽噎痛 乳蛾 喉中

介介如梗 諸物梗咽 項頸強痛

法咽喉大

經云一陰一陽結謂之喉痺又云肝者中之將也取決於膽咽為之使故以喉咽入肝膽部

**咽**主天氣咽主地氣太陽陽明論 地氣通於噎全文見五藏口咽

下接連胸中肺葉之間喘即咽之低處也咽即喉之高處也

咽喉者水穀之道也喉嚨者氣之所以上下者也會厭者

音聲之戶也懸壅者音聲之闕也全文見瘡

**子**和咽與喉會厭與舌此四者同在一門而其用各異喉

以納氣故喉氣通於天咽以納食故咽氣通於地會厭管乎其上以司開闔掩其喉則其食下不掩之其喉錯必舌抵上齦則會厭能閉其喉矣四者交相為用闕一則飲食

瘳而死矣

喉痺

喉痺大法

凡經云喉痺者謂喉中呼吸不通言語不出而天氣閉塞也云咽痛云噎痛者謂咽喉不能納唾與食而地氣閉塞也云喉痺咽噎痛者謂咽喉俱病天地之氣並閉塞也蓋病喉痺者必兼咽噎痛病咽噎痛者不能兼喉痺也今以喉咽俱病諸方並入喉痺門中

亞寒寸脈小者皆為表証

喉痺惡寒及寸脈小弱於關尺者皆為表証宜甘桔湯半桂枝甘草湯詳寒熱發散之若水漿不得入口者用解毒雄黃丸四五粒以極酸醋磨化灌入口內吐出濃痰却服之間以生薑自然汁一蜺殼噙下之神效

按喉痺惡寒者皆是寒折熱寒閉於外熱鬱於內薑汁散其外寒則內熱得伸而愈矣切忌膽礬酸寒等劑點



喉反使其陽鬱結不伸又忌硝黃等寒劑下之反使其陽下陷入裏則禍不旋踵矣韓祗和云寸脈弱小於關者宜消陰助陽垣云兩寸脈不足乃陽氣不足故用表藥提其氣升以助陽也或三部俱小弱亦可用其法也喉痺鄉村病皆相似者屬天行運氣之邪治必先表散之亦大忌酸藥點之寒藥下之鬱其邪於內不得出也其病有二

運氣  
熱邪以  
寒表之

其一屬火經云少陽所至為喉痺又云少陽司天之政三之氣炎暑至民病喉痺治宜仲景桔梗湯或面赤斑者屬陽毒宜陽毒諸方汗之

寒邪以  
熱表之

其二屬濕經云太陰之勝火氣內鬱喉痺又云太陰在泉濕淫所勝病益腫喉痺治宜活人半夏桂枝甘草湯或面青黑者屬陰毒宜陰毒諸方汗之

**仲**桔梗湯治傷寒客熱咽痛方見傷寒咽痛。海藏治咽

**無**荊芥湯治咽喉腫痛語聲不出嘔之痛甚

荊芥兩半 桔梗兩 甘草兩一

右剉散每服四錢水一盞薑三片煎六分去渣溫服

**活**半夏桂枝甘草湯治暴寒中人咽痛方見傷寒咽痛

**無**治卒喉痺不得語小續命湯加杏仁七箇煎甚妙續命湯方

見中風門

**和**五香散治喉咽腫痛毒氣結塞不通

木香 沉香 雞舌香 薰陸香各一兩

麝香另研三錢

右為末入麝香研勻每二錢水一盞煎服不拘時

**本**治中風急喉痺欲死者白僵蚕搗篩為末生薑自然汁

調下喉立愈丹溪云僵蚕屬火而有土與木老得金氣而僵治喉痺者取其火中清化之氣以從治相

火散濁逆  
結滯之疾

**陳**附子去皮炮令拆以蜜塗上炙之令蜜入內含之勿咽其汁主喉痺

**和**如聖勝金錠治咽喉急閉腮頰腫痛并單蛾結喉重舌木舌

硫黃

細研一兩半

川芎

一兩

鴈茶

薄荷

去根梗各半兩

貫衆

二兩

硝石

研四兩

荊芥

二兩

右為末生蔥汁搜和為錠每服先用新汲水灌嗽次嚼生薄荷五七葉却用藥一錠同嚼極爛并水嚥下甚者連進三服并以一錠安患處其病隨藥便消

**羅**

征南帥不隣吉亥病咽痛下利

方見表熱裏寒門

洪武戊辰春鄉村病喉痺者甚聚蓋前年終之氣及當年之初之氣二火之邪也予累用此枯湯加黃連半夏薑

喉閉者  
先取痰

蚕鼠粘子根等劑發之挾虛者加參芪喘氣水漿不入者先用解毒雄黃丸醋磨化之灌喉痰出更用生薑汁灌之却用上項藥無不神驗若用膽礬等酸寒點過者皆不治蓋邪鬱不出故也

**解毒雄黃丸**治纏喉風及急喉閉卒然倒仆牙關緊急

雄黃

鬱金

巴豆

各一分  
去皮油  
十四箇

右為細末醋糊為丸黍苳大茶清下七丸吐出頑痰立甦未吐再服如至死者心頭猶熱灌藥不下幹口開灌之下咽無有不治如小兒驚熱痰涎壅塞或二九三九量小大加減灌之一法用雄黃丸三粒醋磨化之尤妙其痰立出即愈

**大治纏喉風雄黃**一塊新汲水磨急灌吐痰

**丹纏喉風**屬熱痰宜用鷲翎蕪桐油探吐之又法用射干逆流水吐之

世遠志去心為末每半錢水小半盞調服口含竹管吐痰涎極捷治喉痺如神

烏犀角膏治咽喉腫痛及一切結喉爛喉道尸纏喉痺喉急喉飛絲入喉重舌木舌等證

皂莢

兩條子揀碎用水三升浸一時久按汁去渣入瓦器內熬成膏

好酒

合

醵硝

百草霜

研一錢同皂角膏攪勻令稠

人參

一錢為末

鵬砂

白霜梅

各少許並研入膏中

右拌和前藥用鷺毛點少許於喉中以出盡頑涎為度却嚼甘草二寸嚥汁吞津若木舌先以麝布蘸水揩舌冷次用生薑片擦之然後用藥

山纏喉風皂角揉水灌下得吐愈

治纏喉風喉痺飲食不通欲死者用反寬草根一莖淨洗內入喉中取寒痰出即瘥神驗更以馬牙硝津蘸之即

絕根反莧草一名紫苑

四治咽痛用土烏藥即矮樟根以醋兩盞煎一盞先噙後嚥吐出痰涎為愈

治纏喉風束氣不通用蛇蛻炙黃芩等分為末溫酒調下一錢七得吐愈

牙關閉者搗鼻取痰

備急如聖散治時氣纏喉風漸入咽塞水穀不下牙關緊急不省人事

雄黃細研

藜蘆生用

白礬飛

猪牙皂角去皮

右等分為細末每用一荳大鼻內搗之立効

世一字散治喉閉氣塞不通飲食不下

雄黃另研

蝎梢七枚

白礬生用

藜蘆各一錢

猪牙皂角七錢

右爲末每用一字吹入鼻中卽時吐出頑涎爲愈  
治喉咽痛牙關緊急用巴荳去殼以紙壓出巴荳油在紙  
上以此紙作捻子點火吹滅以烟薰入鼻中卽時口鼻涎  
流牙關開矣

不帶痰  
寸脈大  
者皆屬  
下証

喉痺不惡寒者及寸脈大滑實於關尺者皆屬下證宜硝  
石青黛等寒藥降之或白礬等酸劑收之也韓祗和云寸  
脈大於關尺者宜消陽助陰東垣云兩寸脈實爲陰盛陽  
虛下之則愈故予每用此法治急喉痺如鼓應桴或三部  
俱實亦可用其法也

**玉鑰匙**治風熱喉痺及纏喉風

硃硝半兩

鵝砂兩

腦子一字

白僵蚕一分

右爲末以竹管吹半錢入喉中立愈

**治喉痺咽痛**用蒲黃甘草青黛芒硝等分爲末時時嚥

荳許神効

療喉痺神驗朴硝一兩細細含嚥汁立愈

玉屑無憂散治纏喉風咽喉疼痛語聲不出咽物有碍或風涎壅滯口舌生瘡大人酒癪小兒妳癪或誤吞骨屑哽塞不下

玄參

貫衆

滑石

砂仁

黃連

甘草

茯苓

山荳根

荊芥

各半兩

寒水石

煨

鵬砂

各三錢

右為末每服一錢先抄入口以清水嚥下此藥除三尸去八邪辟瘧瘵渴

治喉痺呼吸不通須臾欲絕絡石草二兩水升半煎取

二盞去查細細呷之立通

外臺雜要曰本草云絡石味苦溫散寒無毒主風熱

治喉痺白瑞香花根寸許研細調灌之妙白瑞香藥性未詳



卒喉痺取黃栢片含之又黃栢一斤咬咀酒一斗煮二沸去查滓飲便愈

四喉痺水穀不下難言汁咽之甚佳

難言下氣甚速

又方李實根一片噙口內佳治風熱痰喉痺先以干柿湯次以四物湯加黃栢知母養陰則火降矣

靈苑治急喉閉速巡不救者鱖魚膽臘月收陰乾爲末每用少許點患處藥至卽瘥病深則水調灌之

用李實根研水傳頂上一遭治喉痺卒不語羊蹄獨根者勿見風日及婦人難大以三年醋研和如泥生布拭喉令赤傳之

千金方

又方

硫磺

枯礬各五

鵬砂一

杜牛膝調傳

右降之之劑

**羅開關散**治喉風氣息不通

白僵蚕

兩分

枯白礬

各等分

右為細末每服三錢生薑蜜水調下細細服之

**本**治纏喉風用白礬末半錢烏雞子清一箇二味調勻灌入喉中立刻効如神此方活人不計數幸毋忽

**西**喉閉用枯礬末吹納喉中急用燈盞底油脚灌下

**四**治喉痺馬屁勃白礬等分為細末以鷄翎吹入喉中吐

痰二升愈

馬屁勃

治喉閉一握金一握燒灰拌白礬末

炒青色為度用筋三四根壓下舌看喉中端的吹入患處

妙此藥一名八角荷一名山荷葉如川芎樣生深山詩云

一葉一枝花深山是我家疏黃怕我死水銀化成砂

**無**神効散荆芥草麻肉等分為末蜜九皂子大綿裹含化

治喉痺語聲不出者佳

**四** 又方猪牙皂角和霜梅為末噙之

**五** 治喉痹咽腫手足不和惡寒者用鴨嘴膽禁末以筋蘸

藥點患處藥至即瘡神效

右收之之劑

活血

**海** 治喉痹取蟻螬垂汁點在喉中下咽即開

**崔** 治喉痹難塞不通取紅藍花搗絞取汁一小升服之以

瘥為度如冬月無濕花可浸乾者濃絞取汁如前服之極

驗咽喉寒服之皆瘥

**四** 又方用茜草一兩煎服降血中之火

**世** 治咽腫杜牛膝搗自然汁和醋服之本草云杜牛膝主血結及血塊

**無** 馬鞭草散治患喉痹咽腫連煩吐氣數者

馬鞭草本草云馬鞭草味辛涼破血去瘀血散通月經

右搗自然汁每服一合許又一法用馬啣鐵煮汁服

亦妙

治喉痺射干切一片含嚙汁外臺秘要○本草云射干破血消瘀治療老血在心

脾間味辛涼微溫有毒

孫押班都知潘元從喉閉急召孫至於夾袋中取藥末半七吹入喉中少頃潘吐出膿血立愈翌日潘詣孫謝曰火急之難非明公不能救救人之急非藥不能療贈金一百兩願求方以濟非常之急孫以其方授之用猪牙皂角白礬黃連等分細剉新瓦上焙乾為末每用半錢吹入喉中因曰此方無價安用以利易哉遂不受所贈

肺絕

急喉痺其聲如鼾有如痰在喉嚨者此為肺絕之候速宜參膏救之用薑汁竹瀝放開服如未得參膏或先煎獨參湯救之服早者十全七八次則十全四五遲則十全一也

雜方

**一陰一陽結謂之喉痺**陰陽別論

**治喉閉遂巡不救方**

皂莢去皮弦子生半兩為細末以筋頭點少許在腫處更以麝香調藥末厚塗項上須臾便破血

出立療口丹溪以雞毛蘸傳腫處尤妙

又用遠志去心水調傳項上一遭

**治喉痺青艾和莖葉一握用醋同杵傳痺處冬月用乾者**李師方

一法用青艾汁灌下

**山喉閉用蛇床子燒烟薰入喉中愈**

**不喉中卒被毒氣攻痛者切商陸根炙熱隔布熨之冷輒易立愈**

**丹**有人患纏喉風食不能下大麥麴作稀糊嚥之消膩容易下嚥以助胃氣若義云以此代粥食也若能食者不必用此

針灸

**山** 挫喉氣不通者以冷水徐灌之

內經刺灸喉痺法有二、今以經脈所過咽喉取之驗者、及他病相干而致喉痺取之者通六經也、

其一取手足陽明經云喉痺不能言取足陽明能言取手陽明又云胃足陽明脈從大迎前下人迎附循喉嚨所生病者頸腫喉痺視盛虛熱寒陷下取之又云足陽明之別名曰豐隆去踝八寸別走太陰其病氣逆則喉痺卒瘕取之所別也又曰大腸手陽明脈所生病者喉痺視盛虛熱寒陷下取之也

其二取手少陽經云三焦手少陽之脈出缺盆上項繫耳後是動則病隘腫喉痺視盛虛熱寒陷下取之又曰邪客手少陽之絡令人喉痺刺手中指次指爪甲上去端如韭葉各一瘡壯者立已老者頃已左取右右取左是也

其三以經絡所過咽喉者有二經云肝足厥陰之脈循喉嚨之後故喉之後疼者取之累驗也又云腎足少陰之脈上貫肝高循喉嚨竇漢卿所謂必准者照海治喉中之閉塞是也

其四他病相干致喉痺者有一經云心欬之狀喉中介介如梗狀甚則咽腫喉痺取心之俞蓋太陵穴是也

**文潞公**一日喉腫翰林咽喉科治之經三日愈甚上召孫治之孫曰病得相公書判筆一管去筆頭水露筆管點藥入喉便愈孫随手便刺相公昏仆不省人事左右皆驚愕流汗孫乃笑曰非我不能救相公須臾嘔出膿血升餘旬日乃平復如故見上上喜曰孫召良醫甚有手段予嘗治一男子喉痺於大溪穴刺出黑血半盞而愈由是言之喉痺以惡血不散故也凡治此疾暴者必先發散發散不

愈次取痰取痰不愈次去汚血也

**圖治喉痺**

豐隆

湧泉

關衝

甚者以小三棱針或鋒中許言點藥於喉痺

上乃刺出紫血頰下立愈

**喉痺乳蛾**

少商

針入一分臥針向後三分

照海

太衝

**喉閉不通**

少商

隱白

少衝

湧泉

**喉痺頰腫如升水粒不下**

少商

出血

手太指背頭筋

三棱針刺

陽谷

針入一分

**喉痺完骨及天憲氣舍天鼎尺澤合谷商陽陽溪中渚**

**前谷商丘然谷陽交悉主之**

喉痺胸中暴逆先取衛脈

後前三里雲門

皆瀉之

**喉痺刺少陰少陰在手腕當小指掌後動脈是也針入**

三分補之

**喉痺咽如梗三間主之**

喉痺不能言溫留曲池主之



診

喉痺氣逆口喎咽喉如扼狀行間主之 喉痺咽腫水

漿不下璣璣主之 喉痺食不下鳩尾主之

白色養理者肺大肺大則多飲善病喉痺全文見診 心脈大

甚為喉吟全文見治

咽噎痛咽噎不能納唾與食是也

大法

形苦志苦病生於咽噎治之以百藥全文見治法

**四**咽痛必用荊芥 陰虛火炎上者必用玄參

氣虛人參加竹瀝 血虛四物加竹瀝

急病養陰解鬱

咽痛有陰氣大虛陽氣飛越痰結在上遂成咽痛脈必浮

大重取必瀉去死為近宜補陰陽人參一味濃煎湯細細

飲之此証皆是勞嗽日久者有之如用實喉痺條下諸方非徒無益而反害之

咽瘡多虛火游行無制客於咽喉宜用人參蜜炙黃柏荊

芥治之

潤喉散治氣鬱夜熱咽乾梗塞用

桔梗二錢 粉草

紫荷車

香附各三錢

百藥煎一錢半

右為細末傳口內

咽喉生瘡損了不用生薑用之辛辣痛又能散不收

咽痛實熱者

黃連

荆芥

薄荷

蜜薑汁調喻

咽中瘡腫葶麻子一粒去皮朴硝一錢同研新汲水作一

服連進二三服效

丹溪云葶麻子屬金性善散能通毒腫又似屬水當是外利要藥

羅龍麝聚聖丹治心脾客熱毒氣攻衝咽喉赤腫頭痛或

成喉痺或結硬不消愈而復發經久不瘥或舌本腫脹滿

口生瘡飲食難咽並宜服之

川芎

生地

犀角屑

羚羊角

琥珀

研各五錢

馬牙硝

研三錢

鵬砂

研一兩

人參

赤茯苓

各三錢

玄參

桔梗

升麻

鉛白霜

研

連翹

各五錢

硃砂

水飛二錢

牛黃

研二錢

麝香

研三錢

腦子

研三錢

金箔為衣

右為細末煉蜜為丸每兩作十丸用金箔為衣每服一

丸薄荷水化下或細嚼或噙化如無薄荷新水亦可臨

臥用之

祛毒牛黃膏治大人小兒咽喉腫痛舌本強硬滿口生瘡

涎潮喘急飲食難進咽膈不利

牛黃

研三錢

人參

琥珀

犀角

取細末

桔梗

生地

鵬砂

各半兩

雄黃

研一兩

玄參

升麻

各三錢

蛤粉

水飛四兩

寒水石

煅二兩

硃砂

飛研七錢

鉛白霜

腦子

各一錢

金箔

為衣

實熱降  
水之

咽喉備急丹

右爲細末煉蜜丸如小彈子大金薄爲衣用磁石器內收貯每服一九濃煎薄荷湯化下或新汲水服亦得日進二三服噙化亦得

青黛

芒硝

白僵蚕

各一兩  
甘草四兩

右爲細末用臘月內牛膽有黃者盛藥其中陰四十九日多時爲妙

**經**患喉痛含山荳根一片細咽津極妙

**丹**咽痛鵬砂或和膽礬白僵蚕白霜梅和噙又方百藥煎去黑皮鵬砂甘草生白礬等分爲細末每服一錢食後米飲調細細咽下

**因**咽喉卒腫食飲不通黃栢搗傳腫上冷復易之用苦酒和末佳

浮熱表散之

**四** 婦人患咽疼用桔梗一兩生甘草半兩分三貼水二碗煎取一小盞稍熱飲之先與蚤休末細咽之蚤休末即金雞納根是也  
**五** 增損如聖湯治風熱攻衝會厭語聲不出咽喉妨悶腫痛並治之

桔梗二兩

甘草炙一兩半

枳殼湯浸去穢

防風各半兩

右件為細末每服三錢水一大盞煎至七分去渣入酥如麥許攪勻食後溫服

**六** 治虛煩上壅脾肺有熱咽喉生瘡利膈湯

雞蘇葉

荆芥

防風

桔梗

人參

牛旁子

隔紙炒甘草各一兩

右為細末每服一錢沸湯點服如咽痛口瘡甚者加僵蚕一兩

**七** 桔梗湯治咽腫微覺痛聲微季冬合之

麻黃

不火煎

桔梗

錢一

黃芩

錢三

甘草

錢一

白僵蚕

錢三

馬尾勃

兩一

桂枝

錢少

婦身

錢三

右吹咀水二盞煎去查稍熱服食後可徐徐呷之

**四**發聲散治咽痛妨悶咽物則微痛不宜寒涼藥過泄之

此妨悶虛熱也

瓜蒌

錢一

白僵蚕

微炒

桔梗

錢七

甘草

錢二

右為細末每用少許乾糝咽喉中若腫痛左右有紅或

只一壁紅紫長大水米難下用此散一錢朴硝一錢和

勻糝喉中咽津如喉中生赤腫或有小白頭瘡用前散

一錢七白礬細研半錢乾糝

**四**薑汁調僵蚕末治咽痛神效詳見喉痺

**四**蜜附子治感寒咽門閉不能咽大附子一枚生去皮臍

切作大片蜜塗炙令黃含嚥津甘味盡更以附子片塗蜜

之  
寒邪溫

灸用之

之汚血破

**治咽痛**用諸藥不効者此非咽痛乃是鼻中生一條紅線如髮懸一黑泡大如櫻珠垂掛到咽門而止口中飲食不入須用深取牛膝根直而獨條者洗淨入好醋三五滴

同研細就鼻孔滴二三點入去則絲斷珠破其病立安

**肝者中之將也**取決於膽咽爲之使

奇病論

韓方

**咽痛**用倒摘刺根淨洗入好酒醋同研滴在喉中耳若痒卽安 范汪方治喉中腫痛不得飲食燒筆頭灰漿水飲下方寸七

**主咽喉寒鼻中瘡出及乾嘔頭痛食不下生雞子一箇開頭取白去黃著米酢煨拌泔火頻沸起擘下沸定須頻三度就熱飲酢盡不過一二次瘥**

運氣

**運氣咽喉噎痛皆屬寒經云太陽在泉寒淫所勝民病噎**

針灸

痛領腫是也

內經灸刺咽喉有二

其一取足少陰經云腎足少陰之脈所生病者咽腫上氣  
噎乾痛又云噎中腫不能內唾時不能出唾者刺然骨之  
前出血立已左刺右右刺左又云邪客足少陰之絡令人  
噎痛不可納食無故善怒氣上走贛上林億云贛膈也謂  
氣上走膈上也刺足下中央之脈各三痛凡六刺立已左刺右右刺左是  
也

其二取手太陽經云小腸手太陽之脈是動則病噎痛領  
腫視虛實寒熱陷下取之也

咽中痛不可納食湧泉主之 咽腫難言天柱主之  
喉痛瘡不能言天突主之

法同喉痺

乳蛾



浮熱者  
收之

**咽喉乳蛾方**

雄黃

鬱金各五錢

白礬生用二錢半

膽礬五錢

右為細末以竹管吹入喉中立能言語

實熱者  
降之

**粉香散吹乳蛾即開**

白礬三錢

巴豆三粒去皮油

輕粉

麝香各少許

右於鐵器上飛白礬沸入巴豆在礬上枯去不用巴豆為細末三味和合吹喉中

**治懸癰垂長咽中妨悶白礬一兩燒灰鹽花一兩二味**

細研以筋頭點藥在上

**羅青散治單雙乳蛾**

蒲黃五錢

羅青

盆硝研各三錢

甘草二錢

右為細末每服一錢冷蜜水調細細咽之吞不下雞翎

蘸藥喉內掃之立效

**本**玄參散治懸癰痛不下食

玄參兩一

升麻

射干

大黃各半兩

甘草

右為細末用水煎至七分放溫時時含咽良驗

有表者散之

**無**乾薑散治懸癰熱卒暴腫大

乾薑

半夏湯洗去滑等分

右為細末以少許著舌上嚥津

之汚血破

**世**乳蛾用杜牛膝根紅者研調男用女乳汁女用男乳汁納鼻吸之

**丹**治喉中卒生肉綿裹筋頭蘸鹽揩一日六七次易之真

方人

咽中介介如梗狀

**雜方**仲婦人咽中如有炙轆半夏厚朴湯主之

半夏升

厚朴兩

茯苓

生薑各四兩

蘇葉兩

右五味以水七升煮取四升分溫四服日三夜一

**丹**痰結核在咽此濕痰必用痰藥中鹹能軟堅之味

瓜蒌實

青黛

杏仁

海蛤粉

桔梗

連翹

風化硝

右爲末薑蜜丸噲化

針灸

內經灸刺咽噎介介如梗狀有二

其一取陽陵泉經云膽病者善太息口苦嘔宿汁噎中介

介然數唾取陽陵泉是也

其二取太陵經云心欬之狀喉中介介然如梗狀取心之

俞是也

諸物梗喉

出之  
法

**治諸哽**煮薤白令半熟以線縛定手執線頭少嚼薤白咽之度薤白至哽處便牽引哽即出矣 又法用綿一小塊以蜜煮用如食薤法

**世治骨哽入喉**

硝砂

甘草各等分

右爲末以綿裹少許噙之旋旋咽津久之即出

骨哽以乳香燒烟吸入喉即吐出

**本治諸魚骨哽**久不出方以皂角少許吹入鼻中得嚏哽出多秘此方

**獺主魚骨哽**不可出者取獺足於項下爬之亦可煮汁食之

**治哽**蜆蜆膽一枚吞下亦治刺不出傳之刺即出

古今錄療魚骨橫喉中六七日不出取鯉魚鱗皮合燒作

屑水服之卽出未出再服

右治骨哽

**子和**一小兒誤吞一錢在喉中不下諸醫皆不能出亦不能下乃命戴人戴人熟思之忽得一策以淨白表紙令卷實如箸以刀縱橫亂割其端作鬚髻之狀又別取一箸縛針鈎於其端令不可脫先下咽中輕提輕抑探之覺鈎入於錢竅然後以紙卷納之咽中與鈎尖相抵覺鈎尖入紙卷之端不得肌肉提之而出

**書**誤吞釵取雄白曝令萎黃煮使熟勿切食一大束釵卽隨出

**扁**治誤吞錢釵及銀用飴糖一片漸漸食之自出

外臺秘要

右治錢哽

**世**治骨哽槿樹葉油馬尾勃砂糖三味熬膏爲丸嚥化累

下之法

効

治骨哽喉痛用水牛屎上生出藁晒乾爲末用砂糖爲丸徐徐嚥吞下仍用砂糖爲衣不然損牙

**外**治魚骨哽在喉中以少礪砂口咀嚥咽之立下

**世**治魚骨哽用玉簪花根研細取汁竹管灌喉中不可著

齒着則齒酥骨哽用萱草根汁服之傳者云可立視骨

下藥云萱草卽鹿蔥也又名宜男又方魚骨哽細嚼蘿蔔徐徐咽之愈

**世**治魚骨哽百法不能療者錫糖丸如鷄子黃大吞之立

出方後

治諸哽生艾數升水酒各五升煮取四升稍熱服之外臺

**世**魚骨哽楮子搗自然汁濾去渣服或收晒乾爲末水和

汁服亦可楮子卽谷子也一方用楮樹皮

**世**橄欖味澁食久則甘嚼汁咽治魚哽

**治哽**以瞿麥爲末水調方寸匕服

**治骨哽**白茯苓一味臨時細切爲末以所哽骨煎湯調

下

**治雞骨哽**用水簾草搗汁飲之骨自消 **治骨哽**以野

苧根洗淨搗爛如泥每用龍眼大如被雞骨所傷以雞羹

化下如魚骨所傷魚湯化下 **治一切骨哽**用金鳳花子

嚼爛嚥下無子用根亦好

**山**誤吞稻芒麥芒咽間者急取鵝口中涎灌之或取薦頭

草嚼亦妙

**丹**魚骨在肚中刺痛煎茱萸汁一盞飲之骨軟而出食

**丹**治吞錢艾一把水五升煎至一升頓服便下錢氏方

治吞錢及鐵物在喉者不得下南燭根燒細末湯調一錢

下之

誤吞錢百部根四兩酒一升漬一宿溫服一升日再服

之

外臺 又方誤吞銅錢用家茨菰取汁呷飲自消

誤吞錢併金銀等物以糊粉一兩搗調之分再服如吞

金銀物在腹中以水銀服之令消烱

無凡治哽之法皆以類推如鸕鷀治魚哽礞石治針哽髮

灰治髮哽狸虎治骨硬亦各從其類也

項頸強痛

缺盆之中任脈也名曰天突

當缺盆中央

一次任脈

側之動脈足陽明也名曰人迎

按喉二旁之

二次脈手

陽明也名曰扶突

按喉動脈之前一寸後是

三次脈手太陽也

名曰天窗

手陽明之後當

四次脈足少陽也名曰天容

曲頰之後當

五次脈手少陽也名曰天牖

六次脈足太陽也名曰天柱

按項大筋

七次脈頸中央



針灸

之脈督脈也名曰風府 足陽明挾喉之動脈也其脰在  
膺中 手陽明次在其脰外不至曲頰一寸 太陽當曲  
頰 足少陽在耳下曲頰之後 手少陽出耳後上加完  
骨之上 足太陽挾項大筋之中

俱本  
輪篇

內經刺灸項頸痛有二

其一取足手太陽治項後痛經云足太陽之脈是動則病  
項如拔視虛盛寒熱陷下取之又云項痛不可俛仰刺足  
太陽不可以顧刺手太陽又云大風項頸痛刺風府風府  
在上椎又云邪客於足太陽之絡令人頭項肩痛刺足小  
指爪甲上與肉交者各一痛立已不已則刺外踝下三痛  
左取右右取左如食頃是也

其二取足手陽明治頸前痛經云足陽明之脈所生病者  
頸腫又云手陽明之脈是動則病頸腫皆視盛虛寒熱陷

下取之也

**玄** 頸項痛、後難、

**玉** 項強、承漿、風府、

**甲** 頭項痛重、暫起、僂仆、鼻塞、鼾、喘、息不得通、通天主之、

頂上痛、風、頭重、目如脫、不可左右顧、百會主之、頸痛、

項不得顧、目泣出、多眦、鼻鼾、衄、目內皆赤、痛氣厥、耳目不

用、咽喉後、引項筋、攣不收、風池主之、項腫、不可俛仰、頰

腫、引耳、完骨主之、項強、刺瘡、門、頸項痛、不可以俛仰、

頭痛、振寒、癭、癭、氣實、則脇滿、俠脊、有并氣、熱汗不出、腰背

痛、大杼主之、

東風生於春、病在肝、喻在頸項、全文見五藏

肝筋急

**本** 治筋急、項不得轉、側、木瓜煎、

木瓜

兩箇、取、蓋去、酸、沒藥、所二

乳香所一

八醫經綱目卷五

羌

右二味內木瓜中用蓋子合了竹簽簽定飯上蒸三四次研爛成膏子每服三五匙地黃酒化下生地黃汁半盞無灰酒二盞和之用八分一盞熱煖化服有人患此證自午後發至黃昏時定予曰此患先必從足起經言足十二經絡各有筋惟足太陽之筋自足至項大抵筋者肝之合也日中至黃昏天之陽陽中之陰也又曰陽中之陰肺也自離至兌陰旺陽弱之時故靈寶畢法云離至乾腎氣絕而肝氣弱肝腎二臟受陰氣故發於是時予授此方三服而愈

熱痰

**聖**男子項強不能回顧動則微痛診其脈弦而數實右手爲其平作痰熱客太陽經治之用二陳湯加酒洗黃芩羌活紅花服後二日愈

虛熱

**聖**養神湯治精神短少不得睡項筋腫急難伸禁甘溫宜

苦寒

黃芪錢一

人參分三

甘草分七

蒼朮分五

白朮分三

柴胡錢四

升麻錢四

婦身分五

麥芽分五

木香分一

川芎分三

半夏分七

橘皮錢一

黃連分五

黃芩分二

黃柏分一

右咬咀每服五錢水二盞煎去渣稍熱服不拘時

虛

**本**治腎氣上攻項背不能轉移椒附散

大附子

一枚六錢上者  
炮去皮臍末之

右末每二大錢好川椒二十粒用白麴填滿水一盞半

生薑七片同煎至七分去椒入鹽空心服予一親戚患

項筋痛連背髀不可轉移服諸風藥皆不効予嘗憶予

金髓有腎氣攻背強一證予處此方與之一服頓瘥自

爾與人皆不驗蓋腎氣自腰夾脊上至曹溪穴然後入

表寒

泥九宮曹溪一穴非精於搬運者不能透今逆行至此不得通用椒以引婦經則安矣氣上達椒下達故服之愈

治風項強不得顧視穿地作坑燒令通赤以水洒之令冷納生桃葉鋪其席下臥之令項在藥上以衣着項邊令氣上蒸病人汗出良久即瘥

又方治頭項強不得顧視蒸大苳一升令變色納囊中枕之

諸瘕項強皆屬於濕

全文見診法治法見傷寒項強條